






































## MAPA DE SERIES DE VEGETACIÓN

 Ad-Qr.m	 EH10	 Psl
 Ad-Qr.s	 EH18	 RI-Qc
 Bg-Pl	 EH19	 RI-Qr
 Bg-Pl.m	 EH4a	 Rm-Jp.m
 Bg-Pl.w	 EH4b	 RmJp
 BgPl.RI	 EH8	 Sm-Qr
 Bh-Qr	 Gb-Jn	 Sm-Qr.c
 Br-Qr	 M-ZI	 Yc
 Br-Qr+RI-Jp	 Me-Pa	 Ys
 Ch-RI	 Mt	 Yt
 DI-Ag	 Pc-Qr	 ZI
 Do-Ps	 Pc-Qr.t	



**Gb-Jn:** Serie oromediterránea filábrico-nevadense silicícola del enebro rastroso (*Juniperus communis* subsp. *nana*): Genisto baeticae-Junipereto *nanae* S.

**M-ZI:** Serie termomediterránea inferior almeriense occidental semárida del arto (*Mayteno senegalensis* subsp. *europaeus*): *Mayteno europaei-Zizipheto* loti S.

**Me-Pa:** Serie termomediterránea inferior almeriense semárida y árida del cornical (*Peripoca laevigata* subsp. *angustifolia*): *Mayteno europaei-Peripoceto angustifoliae* S.

**Mt:** Complejo politeselar de vegetación edafoxerófila tabernense sobre margas subsalinas.

**Pc-Qr:** Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*): *Paeonio coriacea-Querceto rotundifoliae* S. Faciación típica.

**Pc-Qr.t:** Serie mesomediterránea, bética, seca subhúmeda basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*): *Paeonio coriacea-Querceto rotundifoliae* S. Faciación termófila bética con *Pistacia lentiscus*.

**PsI:** Geoserie edafoxerófila litoral termomediterránea mediterráneo-iberolevantina psammófila.

**RI-Qc:** Serie mesomediterránea semárida guadiano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa de la coscoja (*Quercus coccifera*): *Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae* S. Faciación guadiano-bacense y almeriense con *Ephedra fragilis*.

**RI-Qr:** Serie termo-mesomediterránea murciano-almeriense, valenciano-tarraconense y setabense de la encina (*Quercus rotundifolia*): *Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae* S.

**Rm-Jp.m:** Serie edafoxerófila meso-supramediterránea malacitano-almijarenses, guadiano-bacense, rondeña y subbética basófila de la sabina mora (*Juniperus phoenicea*): *Rhamno myrtifoliae-Junipereto phoeniceae* S. Faciación mesomediterránea.

**RmJp:** Serie edafoxerófila meso-supramediterránea basófila de la sabina mora (*Juniperus phoenicea*): *Rhamno myrtifolia-Junipereto phoeniceae* S. Faciación típica supramediterránea.

**Sm-Qr:** Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*): *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae* S. Faciación típica.

**Sm-Qr.c:** Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (*Quercus rotundifolia*): *Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae* S. Faciación calcifuga con *Cytisus malacitanus*.

**Yc:** Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos de Sierra Cabrera

**Ys:** Complejo de vegetación edafoxerófila sobre yesos de Sorbas

**Yt:** Complejo de vegetación edafoxerófila tabernense sobre yesos

**ZI:** Serie termomediterránea almeriense semárida y árida del azulifalo (*Ziziphus lotus*): *Zizipheto* loti S.

**Ch-RI:** Serie termomediterránea superior murciano-almeriense semárida del lentisco (*Pistacia lentiscus*): *Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis* S.